


Mal de dos

**URGENCE,
APPELEZ LE 911**

- Vous avez de la difficulté à retenir vos selles ou votre urine.
- Vous avez des douleurs à la poitrine ou au ventre.



Quand demander l'aide d'un professionnel

- Vous ressentez une faiblesse dans les jambes.
- Vous faites de la fièvre (plus de 38,1 °C).
- Vous avez mal au dos à cause d'une chute ou d'un accident.
- La douleur augmente ou ne s'améliore pas après 6 semaines.
- C'est votre premier mal de dos sévère et vous avez plus de 50 ans.

Comment avoir de l'aide

- 24 h sur 24, composez le **811** pour parler à une infirmière.
- Consultez un physiothérapeute, un massothérapeute ou un ostéopathe certifié.
- Appelez votre pharmacien.
- Appelez à votre CLSC.
- Prenez rendez-vous à votre clinique médicale.
- Si vous n'avez pas de médecin, composez le **811** option 3.
- Trouvez un rendez-vous sur rvsq.gouv.qc.ca

Ce guide ne remplace en aucun cas les conseils d'un professionnel de la santé et ne se substitue pas à des soins médicaux.


Tous les contenus sont disponibles sur monproblemedesante.ca

La douleur au dos
peut être très forte
et faire mal jusque
dans la jambe.

Quoi faire à la maison



Glace : Mettez de la glace de 10 à 15 minutes, 4 fois par jour. La glace doit être dans un tissu pour ne pas brûler votre peau.



Médicaments : Demandez conseil à votre pharmacien pour prendre les bons médicaments comme l'acétaminophène (Tylenol®), l'ibuprofène (Advil®) ou un relaxant musculaire.



Exercice : Reprenez doucement vos habitudes.