


Bien comprendre ma chirurgie gynécologique

Fiche d'information à l'intention de la patiente – Préparation à une chirurgie

Appareil génito-urinaire



Cocher le type d'intervention, la voie d'intervention et le type d'anesthésie proposés.

Types d'intervention	Définitions
<input type="checkbox"/> Kystectomie	Retrait chirurgical d'un kyste sur un ovaire ou sur les deux Ne provoque pas de ménopause car une partie de l'ovaire est conservée
<input type="checkbox"/> Stérilisation : <input type="checkbox"/> Ligature tubaire <input type="checkbox"/> Salpingectomie bilatérale	Ligature tubaire : Application de clips au niveau des trompes de Fallope, pour provoquer une stérilité permanente et empêcher la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes Salpingectomie bilatérale : Retrait des deux trompes de Fallope
<input type="checkbox"/> Salpingo-ovariectomie bilatérale	Retrait chirurgical des trompes et des ovaires Peut provoquer une stérilité permanente (salpingo-ovariectomie bilatérale) ou une ménopause (ovariectomie bilatérale)
<input type="checkbox"/> Myomectomie	Exérèse d'un ou plusieurs fibromes (tumeur bénigne fibreuse) avec préservation de l'utérus La fertilité est possible. Les menstruations sont préservées
<input type="checkbox"/> Réanastomose tubaire	Suite à une ligature tubaire, réparation des trompes de Fallope, afin de rétablir la fertilité (désir de grossesse)

Voies d'intervention

Laparotomie

Laparoscopie

Types d'anesthésie

Générale

Rachianesthésie

Complications possibles

Les chirurgies sans risque n'existent pas. Toutefois, plusieurs interventions sont réalisées afin de prévenir ces complications :

1. Infections mineures : Il y a un risque d'infection des plaies abdominales, de la vessie ou des poumons (rare). Elles sont habituellement traitées avec des antibiotiques oraux.
2. Infections sévères : Les infections sévères sont rares. Elles nécessitent une hospitalisation plus longue que prévue ou une réadmission. Des antibiotiques intraveineux sont nécessaires.
3. Hémorragies : Une hémorragie vaginale ou des plaies pourrait entraîner une anémie ou nécessiter des transfusions sanguines (rare). Des hématomes (amas de sang) peuvent aussi se former à l'intérieur de l'abdomen.
4. Il peut aussi survenir une douleur ou une sensibilité dû au passage des trocars de laparoscopie ou à la plaie de laparotomie.
5. Complications rares et plus graves :
 - Une phlébite (caillot dans une jambe) ou une embolie (caillot dans les poumons) est traitée avec la prise d'un médicament qui éclaircit le sang (anticoagulant).
 - Un traumatisme à l'intestin pourrait nécessiter des points de suture ou le retrait d'une partie de l'intestin.
 - Un traumatisme aux uretères (conduit entre la vessie et le rein) ou à la vessie pourrait nécessiter une réparation supplémentaire ou la mise en place d'une sonde vésicale pour une durée prolongée.

Les conséquences sur votre fertilité dépendent du type d'intervention.

Dans tous les cas de laparoscopie, une laparotomie peut être nécessaire.

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

.....

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

5415, boul. de l'Assomption
Montréal (Québec) H1T 2M4

☎ 514 252-3400

🌐 ciuss-estmtl.gouv.qc.ca

D'autres publications et ressources d'intérêt sur la santé sont disponibles sur le site Internet du Centre d'information pour l'utilisateur et ses proches (CIUP).

🌐 <https://biblio-hmr.ca/in/fr/ciup>

✉ ciup.cemtl@ssss.gouv.qc.ca

Tous droits réservés

© CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, HMR, 2018

CP-SFE-139

.....

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal**

Québec 