


Bien comprendre ma chirurgie de prolapsus pelvien

Fiche d'information à l'intention de la patiente – Préparation à une chirurgie

Appareil génito-urinaire



Cocher le type d'intervention, la voie d'intervention et le type d'anesthésie proposés.


Types d'intervention	Définitions
<input type="checkbox"/> Bandelette vaginale sous tension	Suspension de l'urètre dans les cas d'incontinence urinaire Aussi connu sous le nom « <i>tension free vaginal tape</i> » (TVT)
<input type="checkbox"/> Colposacroplexie	Suspension du vagin au niveau du sacrum
<input type="checkbox"/> Cure de prolapsus	Réparation du plancher pelvien qui est relâché Nécessitant de remonter, fixer et replacer soit : <input type="checkbox"/> le vagin (colpocèle) <input type="checkbox"/> la vessie (cystocèle) <input type="checkbox"/> le petit intestin (entérocele) <input type="checkbox"/> le rectum (rectocèle) <input type="checkbox"/> la fermeture du vagin (Procédure de Lefort)

Voies d'intervention

- Vaginale
- Laparotomie
- Laparoscopie

Types d'anesthésie

- Générale
- Rachianesthésie



Conséquences et complications possibles

Les chirurgies sans risque n'existent pas. Toutefois, plusieurs interventions sont réalisées afin de prévenir ces complications :

1. Infections mineures : Il y a un risque d'infection de la plaie vaginale ou des plaies abdominales, de la vessie ou des poumons (rare). Elles sont habituellement traitées avec des antibiotiques oraux.
2. Infections sévères : Les infections sévères sont rares. Elles nécessitent une hospitalisation plus longue que prévue ou une réadmission. Des antibiotiques intraveineux sont nécessaires.
3. Hémorragies : Une hémorragie vaginale ou des plaies pourrait entraîner une anémie ou nécessiter des transfusions sanguines (rare). Des hématomes (amas de sang) peuvent aussi se former à l'intérieur de l'abdomen.
4. Il peut aussi survenir une douleur ou une sensibilité due au passage des trocarts de laparoscopie ou à la plaie de laparotomie.
5. Complications rares et plus graves :
 - Une phlébite (caillot dans une jambe) ou une embolie (caillot dans les poumons) est traitée avec la prise d'un médicament qui éclaircit le sang (anticoagulant).
 - Un traumatisme à l'intestin pourrait nécessiter des points de suture ou le retrait d'une partie de l'intestin.
 - Un traumatisme aux uretères (conduit entre la vessie et le rein) ou à la vessie pourrait nécessiter une réparation supplémentaire ou la mise en place d'une sonde vésicale pour une durée prolongée.

Une vie sexuelle normale peut être possible après votre intervention. Discutez-en avec votre médecin. Dans tous les cas de laparoscopie, une laparotomie peut être nécessaire.

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

.....

Hôpital Maisonneuve-Rosemont
5415, boul. de l'Assomption
Montréal (Québec) H1T 2M4

☎ 514 252-3400
🌐 ciuss-estmtl.gouv.qc.ca

D'autres publications et ressources d'intérêt sur la santé sont disponibles sur le site Internet du Centre d'information pour l'utilisateur et ses proches (CIUP).

🌐 <https://biblio-hmr.ca/in/fr/ciup>
✉ ciup.cemtl@ssss.gouv.qc.ca

Tous droits réservés
© CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, HMR, 2018

CP-SFE-137
.....

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal**

Québec 