


Bien comprendre mon hystérectomie


Fiche d'information à l'intention de la patiente – Préparation à une chirurgie

Appareil génito-urinaire



Cocher le type d'intervention, le type d'incision, la voie d'intervention et le type d'anesthésie proposés.

| Types d'intervention | Définitions |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Hystérectomie | Retrait chirurgical de l'utérus et généralement du col de l'utérus |
| <input type="checkbox"/> Salpingo-ovariectomie | Retrait chirurgical des trompes et des ovaires (une ou deux) |
| Types d'incision | Définitions |
| <input type="checkbox"/> Laparotomie verticale | Incision à la verticale de la paroi abdominale, sous l'ombilic jusqu'au pubis |
| <input type="checkbox"/> Laparotomie transversale | Incision à l'horizontale de la paroi abdominale, juste au-dessus du pubis |
| <input type="checkbox"/> Laparoscopie | Insertion d'un laparoscope et d'autres instruments chirurgicaux par de petites incisions dans l'abdomen. L'utérus est retiré par le vagin. |
| <input type="checkbox"/> Vaginale | Aucune incision de la peau n'est réalisée. L'utérus est retiré par le vagin. |
| Types d'anesthésie | |
| <input type="checkbox"/> Générale | |
| <input type="checkbox"/> Rachianesthésie | |



Conséquences et complications possibles

Suite à l'intervention, vous n'aurez plus de menstruations. Donc, vous ne pourrez plus être enceinte.

Si on a retiré vos ovaires, vous deviendrez ménopausée. Dans ce cas, votre médecin pourra vous proposer divers moyens pour contrôler les effets de la ménopause (si nécessaire). Une hormonothérapie et la prise de suppléments vitaminiques pourraient être prescrites.

Il est probable que votre vie sexuelle demeure normale.

Dans tous les cas de laparoscopie, une laparotomie peut être nécessaire.

Les chirurgies sans risque n'existent pas. Toutefois, plusieurs interventions sont réalisées afin de prévenir ces complications :

1. Infections mineures : Il y a un risque d'infection de la plaie vaginale ou des plaies abdominales, de la vessie ou des poumons (rare). Elles sont habituellement traitées avec des antibiotiques oraux.
2. Infections sévères : Les infections sévères sont rares. Elles nécessitent une hospitalisation plus longue que prévue ou une réadmission. Des antibiotiques intraveineux sont nécessaires.
3. Hémorragies : Une hémorragie vaginale ou des plaies pourrait entraîner une anémie ou nécessiter des transfusions sanguines (rare). Des hématomes (amas de sang) peuvent aussi se former à l'intérieur de l'abdomen.
4. Il peut aussi survenir une douleur ou une sensibilité due au passage des trocarts de laparoscopie ou à la plaie de laparotomie.
5. Complications rares et plus graves :
 - Une phlébite (caillot dans une jambe) ou une embolie (caillot dans les poumons) est traitée avec la prise d'un médicament qui éclaircit le sang (anticoagulant).
 - Un traumatisme à l'intestin pourrait nécessiter des points de suture ou le retrait d'une partie de l'intestin.
 - Un traumatisme aux uretères (conduit entre la vessie et le rein) ou à la vessie pourrait nécessiter une réparation supplémentaire ou la mise en place d'une sonde vésicale pour une durée prolongée.

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

.....

Hôpital Maisonneuve-Rosemont
5415, boul. de l'Assomption
Montréal (Québec) H1T 2M4

☎ 514 252-3400
🌐 ciuss-estmtl.gouv.qc.ca

D'autres publications et ressources d'intérêt sur la santé sont disponibles sur le site Internet du Centre d'information pour l'utilisateur et ses proches (CIUP).

🌐 <https://biblio-hmr.ca/in/fr/ciup>
✉ ciup.cemtl@ssss.gouv.qc.ca

Tous droits réservés
© CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, HMR, 2018

CP-SFE-136
.....

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal**

Québec 