Notes personnelles

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Hôpital Maisonneuve-Rosemont
5415, boul. de l'Assomption
Montréal (Québec) H1T 2M4

514 252-3400
ciusss-estmtl.gouv.qc.ca

D'autres publications et ressources d'intérêt sur la santé sont disponibles sur le site Internet du Centre d'information pour l'usager et ses proches (CIUP).

https://biblio-hmr.ca/in/fr/ciup

Tous droits réservés
© CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, HMR, 2019

CP-SFE-142

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Québec

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Instructions pour l'autoprélèvement d'échantillon vaginal

Québec

Précaution :
Le contenu du tube de prélèvement peut entraîner des irritations en cas de contact avec la peau ou autres parties du corps.

Description des étapes

Préparation avant le prélèvement d'échantillon

1. Se laver les mains

Il est essentiel de se laver les mains avant de manipuler le kit de prélèvement.

Temps de lavage :
- Alcool : 20 à 30 secondes
- Savon : 40 à 60 secondes

2. Positionner

Prendre l'écouvillon tissé (jeter l'autre) d'une main et de l'autre main séparer les plis de peau (lèvres) autour de l'ouverture du vagin.

Ne pas toucher ou déposer l'embout de l'écouvillon sur une surface.

3. Prélever



Insérer l'écouvillon à l'intérieur du vagin à une profondeur de 5 cm (2 po).

Faire tourner doucement pendant 30 secondes tout en frottant l'écouvillon contre les parois vaginales.

Retirer délicatement l'écouvillon.

ATTENTION : l'écouvillon ne doit pas toucher à aucune surface avant d'être placé dans le tube de collecte.

4. Ouvrir



Retirer le bouchon du tube à l'aide de la main tenant déjà l'écouvillon tel que montré sur l'image.

5. Aligner



Insérer l'écouvillon dans le tube jusqu'à ce que la ligne noire visible sur la tige soit alignée avec le rebord du tube.

L'extrémité de l'écouvillon devrait être située juste au-dessus du liquide.

6. Rompre



Incliner avec précaution l'écouvillon contre le rebord du tube et rompre la tige au niveau de la ligne noire.

Jeter la partie supérieure de l'écouvillon.

7. Fermer

Refermer le tube en vissant bien le bouchon.

Se laver à nouveau les mains.

Retourner l'échantillon à l'infirmière de la clinique.

_____

_____